

# ! Signalez vos observations du Rapana veiné *Rapana venosa* !



## L'identifier



- Ombrilic (flèche noire) très marqué
- Coquille grisâtre à marron rouge à l'ext. et orange à l'int.
- Jusqu'à 19 cm
- Grande ouverture : large et haute



## Attention à la confusion possible avec le pourpre *Stramonita haemastoma*. Formes proches et couleurs similaires mais :

- Que jusqu'à 8 cm
- Coquille plus allongée : spires du sommet moins aplaties
- Ouverture moins large et moins haute par rapport à la taille des spécimens
- Pontes plus petites et plus aplaties

## Comment procéder :

### 1. Répondez à ces questions

Prénom NOM : \_\_\_\_\_

Activité : \_\_\_\_\_

Date de collecte : \_\_\_\_\_

Lieu (le plus précis possible, coordonnées GPS si disponibles) : \_\_\_\_\_

Substrat :  sable nu -  vase nue -  herbier -  récif d'huîtres -  autres : \_\_\_\_\_

Engin de collecte : \_\_\_\_\_

Nombre de spécimens : \_\_\_\_\_

Taille approximative : \_\_\_\_\_

Ponte ?  oui -  non

2. Rapportez nous vos fiches et les individus récoltés (vivants ou congelés) à la station IFREMER de La Tremblade, avenue de Mus de Loup.



## Informations diverses

- Espèce non indigène prédatrice des huîtres, moules et palourdes en ouvrant la coquille et en aspirant la chair
- Espèce réglementée (France et Europe, article L411-6 du Code de l'Environnement) en 2021

N'hésitez pas à nous contacter :

[audrey.bruneau@ifremer.fr](mailto:audrey.bruneau@ifremer.fr) (06.75 07 86 96) – [jean.francois.pepin@ifremer.fr](mailto:jean.francois.pepin@ifremer.fr)  
[benoit.gouillieux@u-bordeaux.fr](mailto:benoit.gouillieux@u-bordeaux.fr) – [cecile.masse@mnhn.fr](mailto:cecile.masse@mnhn.fr)